

**財團法人台灣省私立高雄仁愛之家附設慈惠醫院 藥劑科**  
**藥品更換包裝量 異動通知**

通知日期：110.01.05

公告單位：藥劑科

異動項目	藥品代碼	本院使用藥名	成份及含量	劑型	製造商	外觀
啟用	EBET200	Better Iodine Aq. 100mg/ml , <b>200 ml</b> 金碘藥水	Each 毫升 contains : Povidone-Iodine 100mg (相當於有效碘 10mg)	外用液劑	杏輝製藥股份 有限公司	
					許可證字號 / 健保代碼	
					衛署藥製字第 019423 號 / 自費	
異動項目	藥品代碼	本院使用藥名	成份及含量	劑型	製造商	外觀
停用	EBETS	Better Iodine Aq. 100mg/ml , <b>3800 mL</b> 金碘藥水	Each 毫升 contains : Povidone-Iodine 100mg (相當於有效碘 10mg)	外用液劑	杏輝藥品工業股份 有限公司	
					許可證字號 / 健保代碼	
					衛署藥製字第 019423 號 / 自費	

**異動說明：**包裝量變更；由 3800 mL 金碘藥水變更為 200 mL 金碘藥水。

**適應症：**緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等導致皮外之傷口及傷口周圍的洗淨、消毒、殺菌來防止傷口的感染。

**用法用量：**塗抹於患部，或以紗布、脫脂棉等沾取塗抹。

**(1) 細菌性皮膚感染症、濕疹樣白癬及褥瘡：**可用本藥水每天塗擦 2 至 3 次。

財團法人台灣省私立高雄仁愛之家附設慈惠醫院 藥劑科  
藥品更換包裝量 異動通知

- (2) 火傷、擦傷、刀傷及其他外傷：直接塗擦本藥水於患處。
- (3) 念珠菌、滴蟲及非特性細菌感染引起之白帶或陰道炎：請用清水稀釋 20 倍沖洗陰道及肛門附近也可用浸此藥水的棉花球，請 24 小時一次塞於陰道。
- (4) 口角炎、鵝口瘡、拔牙前後、口頭炎：可用 20 倍之稀釋液，隨時漱口。
- (5) 香港腳患者：可用 20 倍之稀釋液浸洗 20 分後，再用藥水直接擦於患處。
- (6) 小孩痱子疹、尿布疹或肚臍潮濕可用棉花沾本藥水直接塗擦於患處。
- (7) 外科手術前，手術部位之殺菌消毒。

**開封後保存期限：外用藥水開封後保存期限 1 年。若變硬或液化、變色及超過原出廠的有效期限應丟棄。**