


財團法人台灣省私立高雄仁愛之家附設慈惠醫院藥劑科
重新啟用藥品異動通知

通知日期：2021.01.11

通知單位：藥劑科

異動項目	藥品代碼	本院使用藥名	成份及含量	劑型	製造商	外觀
重新啟用	OWIN50	wintermin 50mg (winsumin)	Each tablets contains : chlorpromazine HCl 50 mg	膜衣錠	強生化學製藥廠股份有限公司	
		許可證字號/健保碼				
		衛署藥製字第 025191 號 /AC25191100				
						外觀標示：桔紅色圓形錠劑，有剝痕。

異動說明：109 年度第 2 次藥事管理委員會決議，確認進藥供貨。

適應症：躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙。

用法用量 (1) 雙相情感障礙/精神障礙/思覺失調症：每日 30~800 mg，分 2-4 次服用，常用劑量：每日 200~800 mg/天。建議最大用量 1gm/天。(每日劑量> 1 gm 時，治療收益有限)
(2) 噁心和嘔吐：需要時，每 4~6 小時給予 10~25mg/次。

老人用量 精神障礙：不建議常規使用(Beers Criteria 不建議 65 歲以上老人使用)，必要使用時建議起始劑量為 10-25mg/次、每天 3 次，緩慢調整劑量；平均劑量為 25~75mg/天，分次使用；常用劑量範圍：50~200mg/天，分次使用。很少需要大於 300~400mg/天的劑量。

腎功能不全 謹慎使用，無法被透析。

肝功能不全 謹慎使用。

副作用 (1) 高度鎮靜、低血壓、錐體外徑症狀(帕金森氏症、緊張不全、運動困難、靜坐不能、轉眼危象、角弓反張、及反射亢進)、體重增加、月經異常、男性女乳症、勃起功能障礙、便秘、皮膚色素沉澱、光敏感、視力模糊。
(2) 高劑量下會增加癲癇及痙攣，尤其易發生昏迷、循環性虛脫、嚴重低血壓、骨髓抑制、血液惡性疾病。

財團法人台灣省私立高雄仁愛之家附設慈惠醫院藥劑科
重新啟用藥品異動通知

禁 忌

- (1) 對 phenothiazide 類化合物及類似化合物有過敏症的患者。
- (2) 昏迷狀態、併用大量中樞神經抑制劑(酒精、巴比妥鹽、阿片類藥物和麻醉劑)的患者、循環虛脫狀態。

注意事項

- (1) 重症肌無力、酒精中毒、骨髓抑制、心臟血管疾病、青光眼、肝功能障礙、巴金森氏症、消化性潰瘍、前列腺肥大症(症狀性)、呼吸系統疾病(例如嚴重哮喘，肺氣腫)、Reye's 綜合症、尿滯留症、癲癇發作風險(包括有癲癇發作史，頭部創傷，腦損傷，酗酒或同時使用可能降低癲癇發作閾值的藥物)等患者謹慎使用。
- (2) 年老、瘦弱及虛弱病人建議以較低起始劑量開始治療。
- (3) Chlorpromazine 不建議用於治療老年失智症病患相關的精神病。

孕藥等級

C 級。

哺乳

本藥物會排泄到乳汁中，哺乳之婦女使用本藥，應就使用上之危險效益加以考慮。

儲存條件

本藥品應包裝緊密容器，儲於陰涼 15 ~ 30°C 乾燥避光處，且孩童不易取得處所。